Indikation		Einsatzgebiet / Kultur	Bio / Konv	F/G	Aufwand-menge	Wasserauf-wandmenge	Anwendungszeitpunkt	Anwendungs-art	max. Anzahl der Behandlungen in der Anwendung / in der Kultur bzw. je Jahr	Zeitlicher Abstand in Tagen	Reg. Zeitraum	Warte-frist
180.	Erbsenwickler (*Cydia nigricana*) LASPNI	Gemüsebau / Erbse (Gemüseerbse) PIBSX, *Saatguterzeugung*	Bio	F	Max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, ab Stadium 69 (Ende der Blüte)	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.05.2024 bis 28.08.2024	3 Tage
181.	Grüne Reiswanze (*Nezara viridula*) NEZAVI	Gemüsebau / Erbse (Gemüseerbse) PIBSX	Bio	F	Max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, ab Stadium 69 (Ende der Blüte)	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	3 Tage
182.	Grüne Reiswanze (*Nezara viridula*) NEZAVI	Ackerbau / Sojabohne GLXMA	Bio	F	max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	3 Tage
183.	Apfelblütenstecher (*Anthonomus pomorum*) ANTHPO	Obstbau / Kernobst 3PMFC	Bio	F	3,5 L/ha/m Kronenhöhe; max. 10,5 L/ha	max. 500 L/ha/m Kronenhöhe	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, Stadium 51 (Knospenschwellen: erstes deutliches Anschwellen der Blütenstandsknospen; Knospenschuppen werden länger und bekommen hellere Partien) bis Stadium 72 (Fruchtdurchmesser bis 20 mm (Haselnussgröße))	Spritzen	2 / 2	Mind. 5 Tage	12.03.2024 bis 15.06.2024	7 Tage
184.	Rotbrauner Apfelfruchtstecher (*Rhynchites aequatus*) COENAQ	Obstbau / Kernobst 3PMFC	Bio	F	3,5 L/ha/m Kronenhöhe; max. 10,5 L/ha	max. 500 L/ha/m Kronenhöhe	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, Stadium 55 (Blütenknospen werden sichtbar) bis Stadium 75 (Etwa 50% der sortentypischen Fruchtgröße erreicht)	Spritzen	2 / 2	Mind. 5 Tage	15.03.2024 bis 12.07.2024	7 Tage
185.	Birnenknospen-stecher (*Anthonomus pyri*) ANTHPY	Obstbau / Kernobst 3PMFC	Bio	F	3,5 L/ha/m Kronenhöhe; max. 10,5 L/ha	max. 500 L/ha/m Kronenhöhe	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, Nach der Ernte	Spritzen	2 / 2	Mind. 5 Tage	01.08.2024 bis 28.11.2024	7 Tage

	Indikation	Einsatzgebiet / Kultur	Bio / Konv	F/G	Aufwand-menge	Wasserauf-wandmenge	Anwendungszeitpunkt	Anwendungs-art	max. Anzahl der Behandlungen in der Anwendung / in der Kultur bzw. je Jahr	Zeitlicher Abstand in Tagen	Reg. Zeitraum	Warte-frist
186.	Rüsselkäfer (*Curculionidae*) 1CURCF ausgenommen Steinobstknospen-stecher (*Anthonomus bituberculatus*)	Obstbau / Steinobst 3STFC	Bio	F	3,5 L/ha/m Kronenhöhe; max. 10,5 L/ha	500 L/ha/m Kronenhöhe; max. 1500 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, Stadium 59 (Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium)) bis Stadium 75 (Etwa 50% der sortentypischen Fruchtgröße erreicht)	Spritzen oder Sprühen	2 / 2	Mind. 5 Tage	12.03.2024 bis 28.06.2024	7 Tage
187.	Steinobstknospen-stecher (*Anthonomus bituberculatus*) ANTHTU	Obstbau / Marillen PRNAR	Bio / Konv	F	3,5 L/ha/m Kronenhöhe; max. 10,5 L/ha	500 L/ha/m Kronenhöhe; max. 1500 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen Nach der Ernte	Spritzen oder Sprühen	2 / 2	Mind. 7 Tage	15.08.2024 bis 30.09.2024	--
188.	Stachelbeer-blattwespe (*Nematus ribesii*) NEMARI	Obstbau / Stachelbeeren RIBUC Rote Johannisbeere RIBRU Schwarze Johannisbeere RIBNI	Bio / Konv	F	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn	Spritzen	1 / 1	--	01.05.2024 bis 28.08.2024	1 Tag
189.	Samenlaufkäfer (*Harpalus rufipes*) HARPRU	Obstbau / Erdbeeren FRAAN	Bio / Konv	F	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn	Spritzen	1 / 1	--	01.05.2024 bis 28.08.2024	1 Tag
190.	Samenlaufkäfer (*Harpalus rufipes*) HARPRU	Obstbau / Erdbeeren FRAAN	Bio / Konv	G	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn	Spritzen	1 / 1	--	01.05.2024 bis 28.08.2024	1 Tag
191.	Himbeerblüten-stecher (*Anthonomus rubi*) ANTHRU	Obstbau / Himbeeren RUBID Brombeeren RUBFR	Bio / Konv	F	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn	Spritzen	1 / 1	--	15.03.2024 bis 12.07.2024	1 Tag
192.	Himbeerblüten-stecher (*Anthonomus rubi*) ANTHRU	Obstbau / Himbeeren RUBID Brombeeren RUBFR	Bio / Konv	G	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn	Spritzen	1 / 1	--	15.03.2024 bis 12.07.2024	1 Tag

Indikation		Einsatzgebiet / Kultur	Bio / Konv	F/G	Aufwand-menge	Wasserauf-wandmenge	Anwendungszeitpunkt	Anwendungs-art	max. Anzahl der Behandlungen in der Anwendung / in der Kultur bzw. je Jahr	Zeitlicher Abstand in Tagen	Reg. Zeitraum	Warte-frist
193.	Triebgallmücke (*Prodiplosis vaccinii*) CONTVA	Obstbau / Heidelbeeren VACMY	Bio / Konv	G	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	1 / 1	--	01.04.2024 Bis 29.07.2024	1 Tag
194.	Marmorierte Baumwanze (*Halyomorpha halys*) HALYHA Grüne Reiswanze (*Nezara viridula*) NEZAVI	Gemüsebau / Paprika CPSAN Melanzani (Auberginen) SOLME Tomaten LYPES Gurke CUMSA Gartenbohne PHSVX	Bio	G	max. 10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	4 / 4	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	3 Tage
195.	Marmorierte Baumwanze (*Halyomorpha halys*) HALYHA Grüne Reiswanze (*Nezara viridula*) NEZAVI	Gemüsebau / Salate 3LETC	Bio	G	max. 10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	4 / 4	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	7 Tage
196.	Marmorierte Baumwanze (*Halyomorpha halys*) HALYHA Grüne Reiswanze (*Nezara viridula*) NEZAVI	Gemüsebau / Hülsengemüse 3LEVC	Bio	F	max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	7 Tage
197.	Blattläuse (*Aphididae*) 1APHIF	Gemüsebau / Erbse (Gemüseerbse) PIBSX	Bio	F	max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.04.2024 Bis 29.07.2024	7 Tage
198.	Blattläuse (*Aphididae*) 1APHIF	Gemüsebau / Gemüsesoja GLXMA	Bio	F	max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	7 Tage

Legende:

Legende:

Bio / Konv	Anwendung des Mittels ist nur nur iSd Art. 24 Verordnung (EU) 2018/848 zulässig (Bio) oder auch im konventionellen Anbau (Bio / Konv).
F	Anwendungsbereich Freiland (F)
G	Anwendungsbereich unter Glas (G)
Reg. Zeitraum	Zulassungszeitraum

Bitte beachten Sie die Kennzeichnungselemente sowie Auflagen und Hinweise lt. PSM-Register https://psmregister.baes.gv.at