Indikationstabelle VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0)

Indikation	Schadorganismus	Aufwandmenge und Anwendungsart	Zeitraum	Wiederholungen	Warte-frist
1. Indikation: Weinbau Freiland: **Weinreben**	Echter Mehltau (Oidium) [*Uncinula necator*]	max. 12 kg/ha; Bis Stadium 61 (Austrieb bis Beginn der Blüte): 2,25 – 6 kg/ha; Bis Stadium 71 (bis Fruchtansatz): 3,75 – 9 kg/ha; Ab Stadium 71 (ab Fruchtansatz): 6 – 12 kg/ha; Wasser: 1000 l/ha (Berechnungsbasis); Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, Stadium 12 (2 Laubblätter entfaltet) bis Stadium 85 (Weichwerden der Beeren)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von 3 - 7 Tagen	keine
2. Indikation: Obstbau Freiland **Kernobst**	Schorf (*Venturia* spp.)	max. 7,5 kg/ha (2,5 kg/ha/m Kronenhöhe); Wasser: 500 l/ha/m Kronenhöhe; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr, Stadium 10 (Mausohrstadium: grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um 10 mm; erste Blätter spreizen sich ab) bis Stadium 85 (Fortgeschrittene Fruchtreife: zunehmend sortentypische Intensität der Deckfarbe)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von 3 - 7 Tagen	keine
21. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Feldsalat, Endivie**	Echte Mehltaupilze (*Podosphaera* sp.)	3 kg/ha Wasser: 600 l/ha, spritzen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, Stadium 12 (2. Laubblatt entfaltet) bis Stadium 49 (art-, sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht)	Max. 10 Anwendungen im Abstand von 5 – 7 Tagen	1 Tag
22. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Feldsalat, Endivie**		0,03 kg/100 m² Wasser: 6 l/100 m²; Spritzen			
23. Indikation*: Zierpflanzenbau Freiland: **Zierpflanzen**		3 kg/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm); Wasser: 1000 – 2000 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr	Max. 10 Anwendungen im Abstand von 7 - 10 Tagen	keine
24. Indikation*: Zierpflanzenbau unter Glas: **Zierpflanzen**		0,03 kg/100 m² (Pflanzenhöhe bis 50 cm); Wasser: 10 - 20 l/100 m²; Spritzen			

Indikationstabelle VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0)

Indikation	Schadorganismus	Aufwandmenge und Anwendungsart	Zeitraum	Wiederholungen	Warte-frist
59. Indikation*: Obstbau Freiland: **Steinobst**	Schrotschusskrankheit (*Stigmina carpophila*)	2,5 kg/ha/m Kronenhöhe max. 7,5 kg/ha; Wasser: 500 l/ha/m Kronenhöhe; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr, Stadium 60 (Erste Blüten offen) bis Stadium 85 (Fortgeschrittene Fruchtausfärbung)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 3 Tagen	keine
60. Indikation*: Obstbau Freiland: **Steinobst**	Echter Mehltau (*Podosphaera* sp.)	3,34 kg/ha/m Kronenhöhe max. 10 kg/ha; Wasser: 500 l/ha/m Kronenhöhe; Spritzen oder sprühen			
61. Indikation*: Obstbau Freiland: **Erdbeeren**	Echter Mehltau (*Podosphaera aphanis*)	Max. 5 kg/ha; Wasser: 500 – 1000 l/ha; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr, Stadium 10 (Schieben des ersten Laubblattes) bis Stadium 85 (Fortgeschrittene Fruchtreife: Basisbeeren der ersten Trauben sortentypisch ausgefärbt)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 3 Tagen	keine
62. Indikation*: Obstbau unter Glas: **Erdbeeren**					
63. Indikation*: Obstbau Freiland: **Johannisbeerartiges Beerenobst**	Echte Mehltaupilze (*Erysiphaceae)*	Max. 5 kg/ha; Wasser: 500 – 1000 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr, Stadium 60 (Erste Blüten offen) bis Stadium 85 (Fortgeschrittene Fruchtausfärbung)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	keine
64. Indikation*: Obstbau unter Glas: **Johannisbeerartiges Beerenobst**					
93. Indikation*: Obstbau Freiland: **Himbeerartiges Beerenobst**	Echte Mehltaupilze (*Erysiphaceae)*	Max. 5 kg/ha; Wasser: 500 – 1000 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr, Stadium 60 (Vereinzelt erste Blüten offen) bis Stadium 85 (Fortschreiten der Fruchtausfärbung an den ersten Früchten)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	keine
94. Indikation*: Obstbau unter Glas: **Himbeerartiges Beerenobst**					

Indikationstabelle VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0)

Indikation	Schadorganismus	Aufwandmenge und Anwendungsart	Zeitraum	Wiederholungen	Warte-frist
95. Indikation*: Obstbau Freiland: **Heidelbeerartiges Beerenobst**	Echte Mehltaupilze (*Erysiphaceae)*	Max. 5 kg/ha; Wasser: 500 – 1000 l/ha; Spritzen	Stadium 60 (Vereinzelt erste Blüten offen) bis Stadium 85 (Fortschreiten der art-/sortentypischen Fruchtausfärbung) Bei Infektionsgefahr	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	keine
96. Indikation*: Obstbau unter Glas: **Heidelbeerartiges Beerenobst**					
97. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Hülsengemüse**	Echte Mehltaupilze (*Erysiphaceae)*	2,5 kg/ha und 600 l Wasser/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm); 3,75 kg/ha und 900 l Wasser/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 100 cm); 5 kg/ha und 1.200 l Wasser/ha (Pflanzenhöhe über 100 cm); Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr ab Stadium 61 (Beginn der Blüte: 10% der Blüten offen)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 3 Tagen	keine
98. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Hülsengemüse**					
65. Indikation*: Gemüsebau Freiland: Fruchtgemüse: **Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse**			Bei Infektionsgefahr ab Stadium 61 (1. Blüte offen)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 3 Tagen	keine
66. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: Fruchtgemüse: **Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse**					
67. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Tomate**	Samtfleckenkrankheit (*Fulvia fulva*)		Bei Infektionsgefahr ab Stadium 61 (1. Blütenstand: 1. Blüte offen)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 3 Tagen	keine
68. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Tomate**			Bei Infektionsgefahr ab Stadium 61 (1. Blütenstand: 1. Blüte am Hauptspross offen)		

Indikationstabelle VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0)

Indikation	Schadorganismus	Aufwandmenge und Anwendungsart	Zeitraum	Wiederholungen	Warte-frist
69. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Spargel**	Rost (*Puccinia asparagi*)	8 kg/ ha Wasser: 300 – 800 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr	Max. 4 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	keine
70. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Kräuter (frisch)** 71. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Kräuter (frisch)**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	3 kg/ha; Wasser: 300 – 600 l/ha; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 3 Tagen	keine
72. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Kräuter (frisch)** 73. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Kräuter (frisch)**	Echte Mehltaupilze (*Erysiphaceae)*	3 kg/ha; Wasser: 300 – 600 l/ha; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 3 Tagen	keine
107. Indikation: Gemüsebau Freiland: **Kräuter, *Nutzung als frisches Kraut***	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha; Wasser: 300 – 1000 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Ab Stadium 10 (Keimblätter voll entfaltet) bis Stadium 49 (Vegetatives Erntegut bzw. vegetative Vermehrungsorgane haben endgültige Größe erreicht)	Max. 4 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
74. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Zwiebel**, Nutzung als Trocken- oder Bundzwiebel (Frühlingszwiebel)	Botrytis-Arten (*Botrytis* sp.)	5 kg/ha Wasser: 400 - 600 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
75. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Buschbohne**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: 400 - 600 l/ha; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Ab Stadium 51 (Erste Blütenknospen sichtbar)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag

Indikationstabelle VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0)

Indikation	Schadorganismus	Aufwandmenge und Anwendungsart	Zeitraum	Wiederholungen	Warte-frist
77. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Buschbohne**			Bei Infektionsgefahr Ab Stadium 51 (Erste Blütenknospen sichtbar)		
76. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Stangenbohne**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	Max. 5 kg/ha 2,5 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche Wasser: max. 1.200 l/ha 400 – 600 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Ab Stadium 51 (Erste Blütenknospen sichtbar)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
78. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Stangenbohne**			Bei Infektionsgefahr; Ab Stadium 51 (Erste Blütenknospen sichtbar)		
79. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Melonen** **Wassermelonen**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: 400 - 600 l/ha; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Ab Stadium 51 (1. Blütenansatz mit verlängertem Fruchtknoten am Hauptspross sichtbar)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
80. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Gurke, Zucchini, Patisson**					
81. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Riesenkürbis, Moschus-kürbis, Gartenkürbis**					
82. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Melonen** **Wassermelonen**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	Max. 5 kg/ha 2,5 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche Wasser: max. 1.200 l/ha	Bei Infektionsgefahr Ab Stadium 51 (1. Blütenansatz mit verlängertem Fruchtknoten am Hauptspross sichtbar)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag

Indikationstabelle VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0)

Indikation	Schadorganismus	Aufwandmenge und Anwendungsart	Zeitraum	Wiederholungen	Warte-frist
83. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Gurke** **Zucchini**		400 – 600 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche; Spritzen			
84. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Spargel, Junganlagen**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: max. 1.000 l/ha; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
85. Indikation*: Gemüsebau Freiland: **Spargel, Ertragsanlagen**			Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Nach der Ernte		
91. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Tomaten**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	Max. 5 kg/ha 2,5 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche Wasser: max. 1.200 l/ha 400 – 600 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche; Spritzen	Bei Infektionsgefahr Stadium 51 (1. Blütenstand sichtbar (1. Knospe einzeln stehend)) bis Stadium 89 (Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht.	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
92. Indikation*: Gemüsebau unter Glas: **Melanzani**			Bei Infektionsgefahr Stadium 51 (Blütenknospe sichtbar) bis Stadium 89 (Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht.)		
108. Indikation: Obstbau Freiland: **Erdbeeren**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: 200 - 1.000 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Stadium 10 (Schieben des ersten Laubblattes) bis Stadium 85 (Früchte beginnen sich sortentypisch auszufärben)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
99. Indikation: Obstbau Freiland: **Erdbeeren**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: 1.000 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Stadium 67 (Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter abgefallen) bis Stadium	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag

Indikation	Schadorganismus	Aufwandmenge und Anwendungsart	Zeitraum	Wiederholungen	Warte-frist
			89 (2. Pflücke: weitere Früchte sortentypisch ausgefärbt)		
86. Indikation*: Obstbau Freiland: **Erdbeeren**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: max. 1.000 l/ha; Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Stadium 59 (Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium) bis Stadium 89 (2. Pflücke: weitere Früchte sortentypisch ausgefärbt)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
87. Indikation*: Obstbau unter Glas: **Erdbeeren**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: max. 1.000 l/ha; Spritzen als Reihenbehandlung	Bei Infektionsgefahr Stadium 59 (Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium) bis Stadium 89 (2. Pflücke: weitere Früchte sortentypisch ausgefärbt)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
88. Indikation*: Obstbau Freiland: **Johannisbeerartiges Beerenobst**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: max. 1.000 l/ha; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Stadium 59 (alle Blütenknospen sind durch Streckung der Traubenachse freigelegt) bis Stadium 89 (Schüttelreife: die Basisbeeren neigen zum Abfallen)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
100. Indikation: Obstbau Freiland: **Johannisbeerartiges Beerenobst**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: 200 - 1.000 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Stadium 67 (Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter abgefallen) bis Stadium 89 (Vollreife: Art- /Sortentypische Fruchtausfärbung erreicht. Früchte bzw. Fruchtstände lösen sich relativ leicht)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
109. Indikation: Obstbau Freiland: **Johannisbeerartiges Beerenobst**	Amerikanischer Stachelbeermehltau (*Podosphaera mors-uvae*)	5 kg/ha Wasser: 200 - 1.000 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Stadium 10 (Schieben des 1. Laubblattes) bis Stadium 85 (Fortschreiten der art-/sortentypischen Fruchtausfärbung)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
89. Indikation*: Obstbau Freiland:	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: max. 1.000 l/ha,	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	Max. 6 Anwendungen im	1 Tag

Indikationstabelle VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0)

Indikation	Schadorganismus	Aufwandmenge und Anwendungsart	Zeitraum	Wiederholungen	Warte-frist
Himbeeren **Brombeeren**		Spritzen oder sprühen	Stadium 59 (Blütenblätter (weiß) sichtbar, Blüte noch geschlossen (Stadium sehr kurz)) bis Stadium 89 (Vollreife: sortentypische Fruchtausfärbung an den ersten Früchten erreicht)	Abstand von mind. 5 Tagen	
90. Indikation*: Obstbau unter Glas: **Himbeeren** **Brombeeren**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: max. 1.000 l/ha; Spritzen oder sprühen	Bei Infektionsgefahr Stadium 59 (Blütenblätter (weiß) sichtbar, Blüte noch geschlossen (Stadium sehr kurz)) bis Stadium 89 (Vollreife: sortentypische Fruchtausfärbung an den ersten Früchten erreicht)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
101. Indikation: Obstbau Freiland: **Stachelbeeren**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	5 kg/ha Wasser: 200 - 1.000 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Stadium 67 (Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter abgefallen) bis Stadium 89 (Vollreife: Art- /Sortentypische Fruchtausfärbung erreicht. Früchte bzw. Fruchtstände lösen sich relativ leicht)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
102. Indikation: Obstbau Freiland: **Heidelbeerartiges Beerenobst**					
103. Indikation: Obstbau Freiland: **Himbeeren** **Brombeeren** **Loganbeere**					
110. Indikation: Obstbau Freiland: **Himbeeren** **Brombeeren** **Loganbeere**	Echte Mehltaupilze (*Erysiphaceae*)	5 kg/ha Wasser: 200 - 1.000 l/ha; Spritzen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Stadium 10 (Schieben des 1. Laubblattes) bis Stadium 85 (Fortschreiten der art-/sortentypischen Fruchtausfärbung)	Max. 6 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
104. Indikation: Obstbau Freiland: **Pfirsiche**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	2,5 kg/ha/m Kronenhöhe max. 5 kg/ha Wasser: 500 l/ha/m Kronenhöhe;	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Stadium 67 (Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter abgefallen) bis Stadium	Max. 9 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag
105. Indikation:					

Indikationstabelle VitiSan® (Pfl.Reg.Nr. 3578-0)

Indikation	Schadorganismus	Aufwandmenge und Anwendungsart	Zeitraum	Wiederholungen	Warte-frist
Obstbau Freiland: **Pflaumen (Zwetschgen)**		Spritzen	89 (Genussreife: Früchte haben sortentypischen Geschmack und optimale Festigkeit)		
106. Indikation: Obstbau Freiland: **Süßkirsche**	Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)	2,5 kg/ha/m Kronenhöhe max. 5 kg/ha Wasser: 500 l/ha/m Kronenhöhe; Spritzen	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Stadium 67 (Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter abgefallen) bis Stadium 89 (Genussreife: Früchte haben sortentypischen Geschmack und optimale Festigkeit)	Max. 4 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen	1 Tag

*) Ausweitung des Geltungsbereiches auf geringfügige Verwendung gemäß Art. 51 Abs. 5 der Verordnung EG Nr. 1107/2009

Die Sicherheitskennzeichnung und Sonstige Auflagen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Pflanzenschutzmittelregister der AGES https://psmregister.baes.gv.at/ bzw. dem Etikett.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!