Aktuelle Landwirtschaftsaussendung

// Juni 2023

1. **Effiziente Bestäubung durch Hummeln**
2. **Maiszünslerbekämpfung mit Trichogramma**

Effiziente Bestäubung durch Hummeln

Vorteile durch die Bestäubung mit Hummeln:



- Verbesserter Fruchtansatz = höherer Ertrag
- Gleichmäßiger Reifeprozess der Früchte
- Höhere Qualität der Samen und Samenanlagen
- Früherer Erntetermin
- Rentable Kulturen: Bei Kürbissen, Wassermelonen und Saatgutvermehrungen

Aufwandmenge:

- 1-2 Boxen Tripol/Natupol Booster pro Hektar (abhängig von der Schlaggröße und den Landschaftsstrukturen -> beeinflusst die natürliche Bestäubung)

Varianten:

- **Tripo**l:
  - Hier erfolgt die Bestäubungsleistung 5-8 Wochen lang.
  - Kurzfristige Transportmöglichkeit bei Verschließen des Ausfluglochs während das Einflugloch geöffnet bleibt.
  - Eine Woche vor Blühbeginn aufstellen.

- **Natupol Booster**:
  - Hier erfolgt die Bestäubungsleistung 3-4 Wochen lang.
  - Kurzfristig vor der Blüte aufzustellen
  - Günstigere Variante

Haltung:



- Aufstellung möglichst schattig (eventuell mit Abdeckung)
- Nicht direkt auf den Boden stellen, am besten auf eine waagrechte Unterlage
- Ausflugöffnung nicht sofort nach Platzierung öffnen, damit sich die Hummeln vom Transport erholen können

Lieferbedingungen:

- Für eine problemlose Abwicklung bitte Bestellungen bis spätestens **Donnerstag 16:00** für die **Folgewoche** tätigen
- Bei großen Mengen (> 20 Hummelkästen) bitte möglichst frühzeitig vor dem Lieferwunsch eine Vorbestellung mit der ungefähren Menge bei uns abgeben
- Falls man sich Lieferkosten sparen möchte werden nach Möglichkeit Sammelbestellungen empfohlen

biohelp
Biologischer Pflanzenschutz

Maiszünslerbekämpfung mit Trichogramma (Trichon, Pfl.Reg.Nr. 2549-0)

Die bewährte Methode kurz erklärt:

- Ausbringung händisch mind. 2x im Abstand von 14 Tagen
- In Karten- (zum Aufhängen) oder Kugelform geliefert
- Zeitpunkt: Am besten, wenn weiße Eigelege auf der Unterseite der Blätter entdeckt werden, oder Warndienste beachten (Dieses Jahr kühle Witterung vorherrschend, tendenziell späterer Flug erwartet)

- Die Schlupfwespen (*Trichogramma brassicae*) parasitieren die Eier und verhindern den Larvenschlupf des Maiszünslers
- Der Maiszünsler tritt als Schädling bei Mais, Hanf und Paprika/Pfefferoni auf.

Lieferbedingungen:

- Für eine problemlose Abwicklung bitte Bestellungen bis spätestens **Donnerstag 16:00** für die **Folgewoche** tätigen

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Matthias Theuretzbachner, B.Sc.
Fachberatung Landwirtschaft
biohelp Biologischer Pflanzenschutz - Nützlingszucht
Kapleigasse 16, 1110 Wien
Mobil: +43 (0) 664 92 53 164
Fax: (+43 1) 769 97 69-16
Email: matthias.theuretzbachner@biohelp.at

Unsere gesamte Produktpalette für den landwirtschaftlichen Bereich finden Sie in unserem neuen Produktkatalog für Acker- und Feldgemüsebau, Vorratsschutz und Stallhygiene. Einzelne Produkte können auch auf unserer Homepage (www.biohelp.at) abgerufen werden. Gerne schicken wir Ihnen unseren neuen Produktkatalog und unsere Preisliste zu.