Aktuelle Landwirtschaftsaussendung

// Meldung Indikationserweiterungen

Biologischer Pflanzenschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Sie über die

- Indikationserweiterungen von **Spruzit® Schädlingsfrei Reg. Nr. 3141-0 und Spruzit progress (Reg.Nr. 3141-903)** informieren zu dürfen.
- Außerdem stehen auch schon die **Gefahr in Verzug Zulassungen** der beiden Insektizide fürs Jahr 2024 fest.

Die biotauglichen Insektizide auf Basis Naturpyrethrum und Rapsöl stehen somit im Freiland wieder für viele Kulturen zur Verfügung.

In der untenstehenden Tabelle sind die neu zugelassenen Freilandkulturen aufgelistet:

Biologischer Pflanzenschutz

Indikation		Einsatzgebiet / Kultur	F/G	Aufwand-menge	Wasseraufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	Anwendungsart	max. Anzahl der Behandlungen in der Anwendung / in der Kultur bzw. je Jahr	Zeitlicher Abstand in Tagen	Wartefrist
150.	Kartoffelkäfer	Ackerbau / Kartoffel	F	8 L/ha	400 - 600 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	3
152.	Spinnmilben (zur Befallsminderung)	Gemüsebau / Hülsengemüse	F	Pflanzenhöhe bis 50 cm: 6 L/ha Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 9 L/ha Pflanzenhöhe über 125 cm: 12 L/ha insgesamt max. 18 l/ha	600 L/ha 900 L/ha 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	7
153.	Blattläuse	Gemüsebau / Hülsengemüse	F	Pflanzenhöhe bis 50 cm: 6 L/ha Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 9 L/ha Pflanzenhöhe über 125 cm: 12 L/ha insgesamt max. 18 l/ha	600 L/ha 900 L/ha 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	7
154.	Schmetterlingsraupen, *Freifressend, Nur bedingt wirksam*	Gemüsebau / Hülsengemüse	F	Pflanzenhöhe bis 50 cm: 6 L/ha Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 9 L/ha Pflanzenhöhe über 125 cm: 12 L/ha insgesamt max. 18 l/ha	600 L/ha 900 L/ha 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	7

	Indikation	Einsatzgebiet / Kultur	F/G	Aufwand-menge	Wasserauf-wandmenge	Anwendungszeitpunkt	Anwendungs-art	max. Anzahl der Behandlungen in der Anwendung / in der Kultur bzw. je Jahr	Zeitlicher Abstand in Tagen	Warte-frist
156.	Blattläuse *Ausgenommen Salat-Blattlaus (Nasonovia ribisnigri), Ausgenommen Salat-Wurzellaus (Pemphigus bursarius)* Thripse, *Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)* Zikaden Weiße Fliegen	Gemüsebau / Salate	F	6 l/ha	600 l /ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, Bis Stadium 41 (Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter entfalten sich nicht mehr)	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	3
157.	Blattläuse *Ausgenommen Salat-Blattlaus (Nasonovia ribisnigri), Ausgenommen Salat-Wurzellaus (Pemphigus bursarius)* Thripse, *Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)* Zikaden Weiße Fliegen	Gemüsebau / *Kräuter, Nutzung als frisches Kraut*	F	6 l/ha	600 l /ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	7

	Indikation	Einsatzgebiet / Kultur	F/G	Aufwand-menge	Wasserauf-wandmenge	Anwendungszeitpunkt	Anwendungs-art	max. Anzahl der Behandlungen in der Anwendung / in der Kultur bzw. je Jahr	Zeitlicher Abstand in Tagen	Warte-frist
158.	Schmetterlings-raupen, *Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung*	Gemüsebau / Salat	F	6 l/ha	600 l /ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, Bis Stadium 41 (Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter entfalten sich nicht mehr)	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	3
159.	Schmetterlings-raupen, *Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung*	Gemüsebau / *Kräuter, Nutzung als frisches Kraut*	F	6 l/ha	600 l /ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	7
162.	Spargelkäfer (*Crioceris duodecimpunctata*) Spargelhähnchen (*Crioceris asparagi*) Schmetterlings-raupen, *Freifressend, Zur Befallsminderung*	Gemüsebau / Spargel	F	Pflanzenhöhe bis 50 cm: 6 L/ha Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 9 L/ha Pflanzenhöhe über 125 cm: 12 L/ha insgesamt max. 18 l/ha	600 L/ha 900 L/ha 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	-

Außerdem stehen auch schon die **Gefahr in Verzug Zulassungen** für **Spruzit Schädlingsfrei (Reg.Nr.: 3141-0)** für das Jahr **2024** fest.

Die genauen Anwendungsbestimmungen und die zugelassenen Zeiträume entnehmen Sie bitte der untenstehenden **Tabelle**:

	Indikation	Einsatzgebiet / Kultur	Bio / Konv	F/G	Aufwand-menge	Wasserauf-wandmenge	Anwendungszeitpunkt	Anwendungs-art	max. Anzahl der Behandlungen in der Anwendung / in der Kultur bzw. je Jahr	Zeitlicher Abstand in Tagen	Reg. Zeitraum	Warte-frist
180.	Erbsenwickler (*Cydia nigricana*) LASPNI	Gemüsebau / Erbse (Gemüseerbse) PIBSX, *Saatguterzeugung*	Bio	F	Max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, ab Stadium 69 (Ende der Blüte)	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.05.2024 bis 28.08.2024	3 Tage
181.	Grüne Reiswanze (*Nezara viridula*) NEZAVI	Gemüsebau / Erbse (Gemüseerbse) PIBSX	Bio	F	Max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, ab Stadium 69 (Ende der Blüte)	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	3 Tage
182.	Grüne Reiswanze (*Nezara viridula*) NEZAVI	Ackerbau / Sojabohne GLXMA	Bio	F	max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	3 Tage
183.	Apfelblütenstecher (*Anthonomus pomorum*) ANTHPO	Obstbau / Kernobst 3PMFC	Bio	F	3,5 L/ha/m Kronenhöhe; max. 10,5 L/ha	max. 500 L/ha/m Kronenhöhe	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, Stadium 51 (Knospenschwellen: erstes deutliches Anschwellen der Blütenstandsknospen; Knospenschuppen werden länger und bekommen hellere Partien) bis Stadium 72 (Fruchtdurchmesser bis 20 mm (Haselnussgröße))	Spritzen	2 / 2	Mind. 5 Tage	12.03.2024 bis 15.06.2024	7 Tage
184.	Rotbrauner Apfelfruchtstecher (*Rhynchites aequatus*) COENAQ	Obstbau / Kernobst 3PMFC	Bio	F	3,5 L/ha/m Kronenhöhe; max. 10,5 L/ha	max. 500 L/ha/m Kronenhöhe	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, Stadium 55 (Blütenknospen werden sichtbar) bis Stadium 75 (Etwa 50% der sortentypischen Fruchtgröße erreicht)	Spritzen	2 / 2	Mind. 5 Tage	15.03.2024 bis 12.07.2024	7 Tage
185.	Birnenknospen-stecher (*Anthonomus pyri*) ANTHPY	Obstbau / Kernobst 3PMFC	Bio	F	3,5 L/ha/m Kronenhöhe; max. 10,5 L/ha	max. 500 L/ha/m Kronenhöhe	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, Nach der Ernte	Spritzen	2 / 2	Mind. 5 Tage	01.08.2024 bis 28.11.2024	7 Tage

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

Gefahr in Verzug – Zulassung 2024 Spruzit® Schädlingsfrei Reg. Nr. 3141-0

	Indikation	Einsatzgebiet / Kultur	Bio / Konv	F/G	Aufwand-menge	Wasserauf-wandmenge	Anwendungszeitpunkt	Anwendungs-art	max. Anzahl der Behandlungen in der Anwendung / in der Kultur bzw. je Jahr	Zeitlicher Abstand in Tagen	Reg. Zeitraum	Warte-frist
186.	Rüsselkäfer (*Curculioraidae*) 1CURCF ausgenommen Steinobstknospen-stecher (*Anthonomus bituberculatus*)	Obstbau / Steinobst 3STFC	Bio	F	3,5 L/ha/m Kronenhöhe; max. 10,5 L/ha	500 L/ha/m Kronenhöhe; max. 1500 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen, Stadium 59 (Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium)) bis Stadium 75 (Etwa 50% der sortentypischen Fruchtgröße erreicht)	Spritzen oder Sprühen	2 / 2	Mind. 5 Tage	12.03.2024 bis 28.06.2024	7 Tage
187.	Steinobstknospen-stecher (*Anthonomus bituberculatus*) ANTHTU	Obstbau / Marillen PRNAR	Bio / Konv	F	3,5 L/ha/m Kronenhöhe; max. 10,5 L/ha	500 L/ha/m Kronenhöhe; max. 1500 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen Nach der Ernte	Spritzen oder Sprühen	2 / 2	Mind. 7 Tage	15.08.2024 bis 30.09.2024	--
188.	Stachelbeer-blattwespe (*Nematus ribesii*) NEMARI	Obstbau / Stachelbeeren RIBUC Rote Johannisbeere RIBRU Schwarze Johannisbeere RIBNI	Bio / Konv	F	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn	Spritzen	1 / 1	--	01.05.2024 bis 28.08.2024	1 Tag
189.	Samenlaufkäfer (*Harpalus rufipes*) HARPRU	Obstbau / Erdbeeren FRAAN	Bio / Konv	F	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn	Spritzen	1 / 1	--	01.05.2024 bis 28.08.2024	1 Tag
190.	Samenlaufkäfer (*Harpalus rufipes*) HARPRU	Obstbau / Erdbeeren FRAAN	Bio / Konv	G	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn	Spritzen	1 / 1	--	01.05.2024 bis 28.08.2024	1 Tag
191.	Himbeerblüten-stecher (*Anthonomus rubi*) ANTHRU	Obstbau / Himbeeren RUBID Brombeeren RUBFR	Bio / Konv	F	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn	Spritzen	1 / 1	--	15.03.2024 bis 12.07.2024	1 Tag
192.	Himbeerblüten-stecher (*Anthonomus rubi*) ANTHRU	Obstbau / Himbeeren RUBID Brombeeren RUBFR	Bio / Konv	G	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn	Spritzen	1 / 1	--	15.03.2024 bis 12.07.2024	1 Tag

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

	Indikation	Einsatzgebiet / Kultur	Bio / Konv	F/G	Aufwand-menge	Wasseraufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	Anwendungs-art	max. Anzahl der Behandlungen in der Anwendung / in der Kultur bzw. je Jahr	Zeitlicher Abstand in Tagen	Reg. Zeitraum	Warte-frist
193.	Triebgallmücke (*Prodiplosis vaccinii*) CONTVA	Obstbau / Heidelbeeren VACMY	Bio / Konv	G	10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	1 / 1	--	01.04.2024 Bis 29.07.2024	1 Tag
194.	Marmorierte Baumwanze (*Halyomorpha halys*) HALYHA Grüne Reiswanze (*Nezara viridula*) NEZAVI	Gemüsebau / Paprika CPSAN Melanzani (Auberginen) SOLME Tomaten LYPES Gurke CUMSA Gartenbohne PHSVX	Bio	G	max. 10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	4 / 4	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	3 Tage
195.	Marmorierte Baumwanze (*Halyomorpha halys*) HALYHA Grüne Reiswanze (*Nezara viridula*) NEZAVI	Gemüsebau / Salate 3LETC	Bio	G	max. 10 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	4 / 4	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	3 Tage
196.	Marmorierte Baumwanze (*Halyomorpha halys*) HALYHA Grüne Reiswanze (*Nezara viridula*) NEZAVI	Gemüsebau / Hülsengemüse 3LEVC	Bio	F	max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	7 Tage
197.	Blattläuse (*Aphididae*) 1APHIF	Gemüsebau / Erbse (Gemüseerbse) PIBSX	Bio	F	max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.04.2024 Bis 29.07.2024	7 Tage
198.	Blattläuse (*Aphididae*) 1APHIF	Gemüsebau / Gemüsesoja GLXMA	Bio	F	max. 8 L/ha	600 – 1200 L/ha	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	Spritzen	2 / 2	Mind. 7 Tage	01.06.2024 bis 28.09.2024	7 Tage

Legende:

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

biohelp
Biologischer Pflanzenschutz

Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Matthias Theuretzbachner, B.Sc.
Fachberatung Landwirtschaft
biohelp Biologischer Pflanzenschutz - Nützlingszucht
Kapleigasse 16, 1110 Wien
Mobil: +43 (0) 664 92 53 164
Fax: (+43 1) 769 97 69-16
Email: matthias.theuretzbachner@biohelp.at

Unsere gesamte Produktpalette für den landwirtschaftlichen Bereich finden Sie in unserem neuen Produktkatalog für Acker- und Feldgemüsebau, Vorratsschutz und Stallhygiene. Einzelne Produkte können auch auf unserer Homepage (www.biohelp.at) abgerufen werden. Gerne schicken wir Ihnen unseren neuen Produktkatalog und unsere Preisliste zu.

biohelp
Biologischer Pflanzenschutz

Die aktuelle Zulassungssituation entnehmen Sie bitte immer dem offiziellen Register unter folgendem Link:

https://psmregister.baes.gv.at

Sie können sich jederzeit vom Newsletter unter newsletter@biohelp.at von den Infoaussendungen.abmelden.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!