# Produktinformation

# Chryson - Chrysoperla carnea "Streuware" bzw. "Kartonstreifen"

Art-Nr.: 10635











| | |
|---|---|
| Gebrauchsanweisung: | Chryson_Merkblatt-Druck2xA5_20_03_25.pdf |
| Gebindegrößen: | Sack oder Kartonstreifen mit 500 Nützlingen bzw. Sack mit 5.000 Nützlingen |
| Pflanzenschutzmittel-Registernummer: | 2487 |
| Zusatz: | Florfliegenlarve zur Bekämpfung verschiedener Schädlinge im geschützten Anbau |

# Produktinformation

*Zur Bekämpfung von Blattläusen, Thripsen und Spinnmilben in Gemüsekulturen und Beerenobst (ausgenommen Erdbeeren) im Freiland und unter Glas, in Zierpflanzenkulturen unter Glas sowie im Kern- und Steinobst im Freiland.*
*Gegen Blattläuse in Zierpflanzenkulturen im Freiland und in Erdbeeren im Freiland und unter Glas.*

**Wirkungsweise:** Das erwachsene Tier ist 1-2 cm groß. Blattläuse, Thripse und Spinnmilben werden ergriffen und ausgesaugt. Eine Larve kann während ihrer Entwicklungszeit bis zu 500 Blattläuse aussaugen.

**Anwendung:** Der Einsatz von Florfliegenlarven (*Chrysopa = Chrysoperla carnea* ) ist ab einer Temperatur von ca. 8°C empfehlenswert. Dabei den Nützling in die Befallsherde ausbringen und bei Bedarf die Ausbringung in 14-tägigem Abstand wiederholen.

**Aufwandmengen:**
In Gemüse und Beerenobst (Freiland und unter Glas), in Zierpflanzen unter Glas: 5 - 10 Larven/m².
Im Freiland in Zierpflanzen, Kern- und Steinobst (nur bei Bäumen mit max. 2 m Kronenhöhe) und in Erdbeeren (Freiland und unter Glas): 10 - 50 Larven/m².

**Anmerkung:** Anwendbar bei schwachem und mittel-starkem Ausgangsbefall. Für ein robustes Blattlausbekämpfungssystem sollte der Nützling mit Blattlausparasiten kombiniert werden. Lagerfähigkeit: 2 Tage (bei 6°C). Die Flasche horizontal und im Dunklen lagern.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!