Produktinformation

nemastar® - Steinernema carpocapsae

Art-Nr.: 60212



Gebrauchsanweisung:	nemastar+Infoblatt.pdf
Gebindegrößen:	50 bzw. 500 Mio. Nematoden
Pflanzenschutzmittel-Registernummer:	2969-0
Zusatz:	Nematoden gg. Erdraupen, Maulwurfgrillen, Wiesenschnaken

Die Nematoden der Art *Steinernema carpocapsae* parasitieren die anfälligen Insektenstadien. Nach 2-3 Tagen stirbt der Schädling. Im Kadaver des Wirtsinsekts erfolgt dann die Vermehrung der Nematoden. Nach etwa 14 Tagen verlassen Sie ihren Wirt auf der Suche nach weiteren, überlebenden Schadinsekten.

Aufwandmenge
50 Mio./100 m² in 100 l Wasser

Anwendung gegen Maulwurfsgrillen an Gemüsekulturen (Freiland), sowie an Grün- und Rasenflächen:
Anfang Mai bis Ende Juni max. 4 mal im Abstand von 14 Tagen spritzen (Sieb entfernen, max. 2 bar) oder gießen
Anwendung gegen Erdraupen an Gemüsekulturen (Freiland), sowie an Grün- und Rasenflächen:
Anfang Juli bis Ende September max. 4 mal im Abstand von 14 Tagen spritzen (Sieb entfernen, max. 2 bar) oder gießen
Anwendung gegen Larven der Wiesenschnake an Grün- und Rasenflächen:
Anfang September bis Ende Oktober max. 4 mal im Abstand von 14 Tagen spritzen (Sieb entfernen, max. 2 bar) oder gießen

Anwendungshinweise
Die Bodentemperatur sollte bis zu 2 Wochen nach der Anwendung mind. 12°C betragen und der Boden sollte in diser Zeit ausreichend feucht bleiben.
Die Nematoden nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.

Während der Ausbringung gut rühren, um ein Absetzen der Nematoden zu vermeiden.

Lagerung/Haltbarkeit
bei 4 - 12°C bis zu 6 Wochen haltbar

Gebindegrößen
Säckchen mit 50 Mio. bzw. 500 Mio. Nematoden

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!