Produktinformation

2H13

Art-Nr.: 99035



Sicherheitsdatenblatt:	SDS_2H13 240408_AT.pdf
Gebindegrößen:	1 kg
Zusatz:	Zusatzstoff

Das neue Additiv für Kontaktfungizid- Anwendungen

Inhaltsstoffe:
Granulierte Hefezellen von *Meyerozyma guilliermondii* Stamm 2H13

Wirkungsweise
2H13 verbessert als Additiv das Sprühverhalten und die Anlagerung von Kupfer und Single-Site-Inhibitoren auf der Pflanzenoberfläche. Die biologische Wirksamkeit der Fungizide wird dadurch verbessert.
Die Beimischung wird in erster Linie bei Oomyceten (Kraut und Knollenfäule, Falscher Mehltau) empfohlen. Die Mischung mit 2H13 kann bei geringem Befallsdruck durch gewisse Pilze dazu beitragen, die notwendige Kupferaufwandmenge zu reduzieren.

Einsatzbereich/Anwendung:

0,05 %-ig als Zugabe zur Spritzbrühe für alle Kulturen
Ackerbau: der Einsatz wird vor allem bei Kupferanwendungen im Kartoffenbau empfoheln
Obstbau: Derzeit wird die Zugabe von 2H13 zu single-site Inhibitoren zur Gloeosporium-Bekämpfung im Kernobst empfohlen. Weitere Einsatzgebiete sind durch Versuchstätigkeiten in Abklärung.

Mischbarkeit:

Produktinformation

2H13 ist mit gängigen Kupfer- und schwefelhaltigen Präparaten, sowie mit VitiSan mischbar.
Mehrfachmischungen mit Kupfer und Schwefel sollten vermieden werden
Der Hersteller empfiehlt die Zugabe in den Spritztank vor den Pflanzenschutzmitteln.
Holen Sie zur Mischbarkeit Fachberatung ein!

Lagerung und Haltbarkeit:
Kühl, trocken und frostfrei lagern. Mind. 30 Monate haltbar bei Lagerung <8°C