Produktinformation

Trichostar® plus

Art-Nr.: 60722



Sicherheitsdatenblatt:	10644-0052_Trichostar Plus_SDS_AT_DE_1.2.pdf
Gebindegrößen:	1 lt
Zusatz:	Flüssiger Bodenhilfsstoff für eine intensive Durchwurzelung

Zusammensetzung:
Mikroorganismen (*Trichoderma harzianum* T58) als Bodenimpfmittel zur Aufbereitung von organischem Material und Saccharoselösung als Aufbereitungsmittel.

Wirkungsweise:
Der in Trichostar® plus enthaltene Pilz vermehrt sich im Haarwurzelbereich der Pflanzen und produziert Enzyme und Hormone, welche die Bodenfruchtbarkeit und die mikrobielle Aktivität des Bodens erhöhen. Dieser positive Einfluss auf das Boden-Wurzelsystem bewirkt bei den meisten Pflanzen eine intensivere Durchwurzelung, womit eine bessere Nährstoff- und Wasserversorgung gewährleistet ist. Gleichzeitig wird die Stresswirkung durch äußere Einflüsse, wie Trockenheit, Vernässung, Hitze und Kälte bzw. Frost, auf die Pflanzen vermindert.

Anwendung:
Trichostar® plus sollte in der Bodenkultur in einem möglichst frühen Stadium der Pflanzenentwicklung eingesetzt werden. Nach der Bodendesinfektion oder im sterilen Substrat ist der Einsatz besonders empfehlenswert, da sich der Trichoderma-Pilz dann ohne Konkurrenten vermehren kann. Trichostar® plus kann fast ganzjährig eingesetzt werden. Ausbringung mit allen üblichen Applikationsverfahren möglich.

Anwendungsempfehlungen:
Vor Anwendung gut schütteln.
Aufwandmenge: 2 - 2,5 l/ha bzw. 0,2 - 0,25 %
Wirkungsdauer: 30 – 60 Tage
Temperaturbereich: ab 2 °C bis 35 °C
pH-Bereich: 3,5 – 8

Mischbarkeit:
Trichostar® plus kann mit den meisten organischen und mineralischen Düngern kombiniert werden. Herbizide und

Insektizide beeinflussen die Pilze nicht, aber einige Fungizide können die Effektivität beeinträchtigen.

Lagerung und Haltbarkeit:
Bei 2 - 4 °C: 1 Jahr; angefangene Kanister sollten innerhalb von 4 Wochen aufgebraucht werden